

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 痊愈：治疗 7 天内出血症状消失，B 超显示宫腔内无任何残留物；显效：治疗 7~14 天，出血症状消失，B 超检查示宫内无残留物；有效：治疗 14~21 天，B 超显示宫腔内无残留物，出血症状消失；无效：治疗 21 天后出血症状未缓解或行清宫术止血者。

4.2 2 组临床疗效比较 见表 1。痊愈率、总有效率观察组分别为 41.2%、95.6%，对照组分别为 36.8%、80.9%，2 组比较，差异均有统计学意义($P < 0.05$)。

表 1 2 组临床疗效比较 例

组别	n	疗效				痊愈率(%)	总有效率(%)
		痊愈	显效	有效	无效		
观察组	68	28	22	15	3	41.2	95.6
对照组	68	25	18	12	13	36.8	80.9
χ^2 值	-	-	-	-	-	2.86	2.88
P 值	-	-	-	-	-	0.042	0.044

4.3 2 组安全性比较 见表 2。并发症发生率观察组为 10.3%，对照组为 11.8%，2 组比较，差异无统计学意义($P > 0.05$)。观察组无不良反应出现，对照组不良反应率为 5.9%，2 组比较，差异有统计学意义($P < 0.05$)。

表 2 2 组安全性比较 例

组别	n	并发症				不良反应		
		头晕	心悸	乏力	腹痛	皮疹	腹泻	发生率(%)
观察组	68	2	1	2	2	0	0	10.3
对照组	68	3	2	1	2	2	2	11.8
χ^2 值	-	-	-	-	-	-	-	3.18
P 值	-	-	-	-	-	-	-	0.054

4.4 2 组治疗依从性比较 见表 3。治疗依从率以观察组为 97.1%，对照组为 86.8%，2 组比较，差异有统计学意义($P < 0.05$)。

表 3 2 组治疗依从性比较 例

组别	n	依从性			治疗依从率(%)
		完全依从	基本依从	不依从	
观察组	68	42	24	2	97.1
对照组	68	40	19	9	86.8
χ^2 值	-	-	-	-	2.46
P 值	-	-	-	-	0.028

5 讨论

药物终止妊娠后阴道出血属于中医学产后恶露不尽的范畴^[2]。中医学认为，其发病是因冲任受损，余血不尽导致新血不能归经，加之药物终止妊娠导致机体正气虚衰，外邪侵入，进而引发子宫异常出血，表现为阴道长期大量出血^[3]。因此，

该病属于标实本虚证，因气滞血瘀导致气机不畅，进而导致残留组织无法排出。益母草颗粒主要由益母草组成。益母草味辛苦、凉，功能活血化瘀、调经利水，临床常用于治疗血瘀所致的月经不调，症见经水量少者。近年来，有研究证实，益母草颗粒对药物终止妊娠后阴道出血具有一定的疗效^[1]，但相关研究较少，还有待临床研究的数据支持。本研究中，笔者应用益母草颗粒用于药物终止妊娠后阴道出血的治疗，结果显示治疗组在痊愈率及总有效率等比较中均具有显著优势，不良反应少，依从性高。提示益母草颗粒用于药物终止妊娠后阴道出血疗效显著，适于临床推广使用。

[参考文献]

- [1] 方瑞娟, 张莹. 葆宫止血颗粒联合益母草颗粒治疗药物流产后阴道出血 100 例疗效观察[J]. 北京中医药, 2012, 24(6): 515-518.
- [2] 连红琴, 魏慧, 吴燕平. 吴燕平治疗药流后恶露不绝的经验[J]. 浙江中医药大学学报, 2012, 15(8): 113-116.
- [3] 丁丽仙, 王艳, 翟婷婷. 补肾养血方对人工流产后阴道出血及月经影响的临床观察[J]. 环球中医药, 2010, 24(5): 133-136.

(责任编辑:冯天保)

欢迎订阅 2015 年《新中医》

无论国内还是国外，有中医的地方就有《新中医》，《新中医》摇中医之旗，宣中医之术，传中医之道，解中医之惑；《新中医》去伪存真，去粗取精，造就高手，培养名医。《新中医》坚持面向临床的办刊方针，及时展现当代中医的新观点、新思路、新成果、新技术、新方法、新经验，全心全意为广大读者服务。请新老读者到当地邮局订阅 2015 年《新中医》。《新中医》为广州中医药大学与中华中医药学会共同主办，月刊。刊号：ISSN0256-7415，CN44-1231/R。邮发代号：国内 46-38，国外 M186。定价：每期 18 元，全年 12 期共 216 元，地址：(510006) 广州市番禺区广州大学城环东路 232 号广州中医药大学。联系电话：020-39354129。